



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**BIBLIOTECA CENTRAL**  
**FORMULARIO DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO DE TESIS**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA DE MEDICINA**

**TESIS DE GRADO  MONOGRAFIA  PROYECTO TITULACIÓN**

**TITULO DE LA TESIS: "PREVALENCIA DE VULVOVAGINITIS EN PACIENTES DE 25 A 45 AÑOS, ATENDIDAS EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL IESS RIOBAMBA 2018"**

**AUTORES:** Lidia Marilis Quispe Totoy  
Jorge Mauricio Lema Méndez

**TUTOR:** Dr. Pablo Guillermo Alarcón Andrade

**COLABORADORES:**

**FINANCIAMIENTO:** SI      NO       PREGRADO  X      POSGRADO

**FECHA DE ENTREGA DE LA TESIS: 03/02/2020**

**GRADO ACADEMICO A OBTENER: MÉDICO GENERAL**

**No. Págs.** 64

**No. Ref. Bibliográficas:** 36

**Anexos:** 8

**Planos:** 0

**RESUMEN:**

**INTRODUCCIÓN:** la vulvovaginitis (VV) es la inflamación de la mucosa vaginal y de la piel vulvar evidente clínicamente por presentar una secreción de flujo anormal, irritante, fétido o no, acompañada de prurito y en ocasiones de disuria o dispareunia. **OBJETIVO:** Determinar la prevalencia de vulvovaginitis en pacientes de 25 a 45 años atendidas en consulta externa del Hospital del IESS Riobamba 2018. **MATERIAL Y MÉTODOS:** El estudio se efectuó basándonos en la metodología de investigación con un estudio retrospectivo de corte transversal en una muestra de 315 pacientes con diagnóstico de vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal y tricomoniasis vaginal atendidas en consulta externa del Hospital del IESS Riobamba con un método analítico-empírico donde se analizaron variables como características demográficas, desarrollo de infección de transmisión sexual, conducta sexual y uso de anticonceptivos. **RESULTADOS:** se contabilizó un total de 3017 pacientes entre 25 a 45 años atendidas en consulta externa de ginecología del Hospital IESS Riobamba durante el año 2018, de los cuales 1755 presentan diagnóstico de vulvovaginitis, al aplicar la fórmula de la muestra, nuestra población de estudio fue de 315 pacientes siendo la vaginosis bacteriana la más frecuente con un 61,90% (195), la vulvovaginitis se presentó con mayor prevalencia en mujeres entre 25 a 35 años con un 56,51% (178); casadas con un 49,21% (155) y mestizas con un 89,21% (281); el 62,54% (197) de mujeres inicio su vida sexual entre los 16 a 20 años; el 57,78% (182) de pacientes han tenido entre 2 a 4 parejas sexuales; el 91,11% (287) de pacientes diagnosticadas con vulvovaginitis no han desarrollado una I.T.S y el 48,57% (153) no utilizan métodos anticonceptivos. **CONCLUSIONES:** se logró identificar que la prevalencia de vulvovaginitis es alta siendo la VB la más frecuente, afecta principalmente a mujeres entre 25 a 35 años, casadas, mestizas, que han iniciado su vida sexual entre los 16 a 20 años, han tenido de 2 a 4 parejas sexuales, estas mujeres no han desarrollado una I.T.S y la mayoría no utiliza métodos anticonceptivos.

Palabras claves: vulvovaginitis, vaginosis bacteriana, tratamiento, leucorrea

## TRADUCCION AL INGLES

### TITLE:


Prevalence of Vulvovaginitis in patients aged 25 to 45, treated in an outpatient clinic at the IESE  
Riobamba Hospital 2018

### ABSTRACT:

**INTRODUCTION:** Vulvovaginitis (VV) is the inflammation of the vaginal mucosa and vulvar skin clinically evident due to an abnormal discharge, irritating, foul or not, accompanied by pruritus and sometimes dysuria or dyspareunia. **OBJECTIVE:** To determine the prevalence of vulvovaginitis in patients aged 25 to 45 years treated in an outpatient clinic at the IESE Hospital Riobamba 2018. **MATERIAL AND METHODS:** The study was carried out based on the research methodology with a retrospective cross-sectional study on a sample of 315 patients diagnosed with bacterial vaginosis, vaginal candidiasis and vaginal trichomoniasis treated in an outpatient clinic at the IESE Riobamba Hospital with an analytical-empirical method where variables such as demographic characteristics, development of sexually transmitted infection, sexual behavior and contraceptive use were analyzed. **RESULTS:** A total of 3017 patients between 25 and 45 years of age attended in an outpatient gynecology clinic of the IESE Riobamba Hospital during 2018, of which 1755 presented a diagnosis of vulvovaginitis, when applying the sample formula, our study population It was 315 patients, with bacterial vaginosis being the most frequent with 61.90% (195). Vulvovaginitis presented with the highest prevalence in women between 25 and 35 years old with 56.51% (178); married with 49.21% (155) and mixed with 89.21% (281); 62.54% (197) of women started their sex life between 16 and 20 years; 57.78% (182) of patients have had between 2 to 4 sexual partners; 91.11% (287) of patients diagnosed with vulvovaginitis have not developed an I.T.S and 48.57% (153) do not use contraceptive methods. **CONCLUSIONS:** it was possible to identify that the prevalence of vulvovaginitis is high, with BV being the most frequent, mainly affecting women between 25 and 35 years old, married, mestizo, who have started their sex life between 16 and 20 years, have had 2-4 sex partners, these women have not developed an STI and most do not use contraceptive methods.


**KEY WORDS:** vulvovaginitis, bacterial vaginosis, treatment, leukorrhea

### FIRMAS:



**TUTOR**

Dr. Pablo Guillermo Alarcón Andrade



**GRADUADO**

Jorge Mauricio Lema Méndez



**GRADUADA**

Lidia Marilis Quispe Totoy

### SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE ESTA TESIS EN EL REPOSITORIO DIGITAL DE LA INSTITUCIÓN



Jorge Mauricio Lema Méndez



Lidia Marilis Quispe Totoy

Firma y sello de la Biblioteca Central